

## Пчелиный волк

ПЧЕЛИНЫЙ ВОЛК — ФИЛАНТ, филант пчелиный, пчелиный волк. Наибольшую опасность для пчел представляет ф. треугольниковый. Принадлежит к роду одиночных роющих ос.

Изящные насекомые, голые или маловолосатые. В большинстве случаев они гнездятся в почве, где выращивают личинок, которым скармливают парализованных насекомых и пауков. Это очень подвижные, сильные земляные осы, очень похожие на обычных ос.

Ф. активен с 10 до 18 часов в солнечные дни при температуре не ниже 23 °С. Самцы живут в неглубоких норках, а самки роют глубокие туннели, иногда до 1 м, с камерами размером 2,5x1,5 см по бокам. Обычно гнезда они устраивают на оголенных участках в сухих легких, супесчаных, подзолистых почвах, где можно достаточно быстро и легко вырыть туннель, и реже — суглинистых почвах. Отверстия, ведущие в гнезда ос, можно обнаружить на склонах оврагов и рвов, вдоль дорог с насыпями. Нора Ф. обычно напоминает перевернутое вверх дном блюдце диаметром 12—16 см, с небольшой насыпью высотой в несколько сантиметров. Самцы в строительстве гнезда участия не принимают. Иногда создаются большие колонии этих ос.

Самцы питаются нектаром растений, а самка охотится на медоносных пчел в радиусе 2,5 км, иногда до 5 км от норки. Она приносит и укладывает от 1 до 7 парализованных пчел в камеру, на груди последней принесенной пчелы откладывает яйца. Через 3—4 дня из них появляются личинки, которые в течение 2—5 дней питаются пчелами. Затем личинка плетет блестящий темно-коричневый кокон, в котором продолжает свое развитие, иногда длящееся до 4 недель. Самцы выходят на 4—10 дней раньше самок. В камерах самцов обычно находится 1—2 пчелы, самок — 3—8. В стадии куколки Ф. может зимовать до 10 месяцев.

Размер взрослой осы 12—16 мм, цвет желто-черный. Голова широкая, на лбу имеется рисунок в виде короны: у самцов с тремя зубцами, у самок с двумя. Челюсти сильные. Брюшко и ноги желтые. На спинке имеются черные треугольники.

Осы ловят летных пчел в поле и на пасеке, жалят их в подбородок, парализуя таким образом нервную систему жертвы, а затем, сдавливая лапками брюшко пчел, выдавливают из них нектар и гемолимфу. В период массового лета Ф. пчелосемьи значительно слабеют, прекращают сбор нектара.

Меры борьбы. Запахивают почву, заселенную Ф., засевают ее травой, обильно поливают водой, засыпают сверху листьями и соломой. В норы ос заливают инсектициды. В июле-августе проходит самый активный лет Ф., поэтому пасеку целесообразнее перевезти подальше.

---

Литература: Белик Э.В. Пчеловод. Словарь - справочник. - Ростов н/Д.: Феникс; Донецк: издательский центр "Кредо", 2007. <http://www.phoenixrostov.ru/> Феникс, <http://www.kredo.com.ua/> издательский центр "Кредо"

© Гришин Михаил, 2014 г., [mail@grishinmv.ru](mailto:mail@grishinmv.ru), <http://www.medoviy.ru>