

Сорокопуть

СОРОКОПУТЫ — наиболее опасные для пчел птицы. Это мелкие, реже — среднего размера птицы с характерным крючкообразным клювом.

Существует много видов С. Населяют они заросли кустарников, опушки лесов, поймы рек, культурные насаждения на равнинах и в горах. Избегают густых зарослей деревьев. Питаются позвоночными и беспозвоночными насекомыми. Наиболее часто истребляет пчел-сборщиц серый С. Длина его тела 27 см. Спина самца пепельно-серая, плечи и брюшко белые, крылья и хвост сверху черные. Самка окрашена менее ярко.

Рыжий С. (жулан), длиной около 20 см. У самца спина и плечи рыжевато-красные, остальная часть верха голубовато-серая, нижняя сторона белая с красноватым оттенком. У самки спина рыжевато-бурая, брюшко желтовато-бурое с бурыми полосами.

Красноголовый С, длина которого 18 см. У самца голова рыжевато-красная, спина, крылья и хвост черные, на крыльях и на плечах имеются белые пятна. Брюшко белое с рыжеватым оттенком. У самки оперение бледнее, чем у самца.

Чернолобый С, длина его достигает 24 см. У самца пепельно-серая спина, брюшко розового оттенка, крылья черные с белым пятном. Оперение самки более бледное. Все С. весьма прожорливы. Поселяясь вблизи пасек, они наносят им огромный вред. Летом 55% корма серого С. составляют насекомые, из них 1/4 шмели, осенью соответственно 94 и 41%. Мелких насекомых, а также рабочих пчел С. съедают на лету, крупных же насекомых, таких как матки шмелей и пчел, они надевают на колючки кустарников.

Меры борьбы. С. отпугивают с пасек так же, как и щурок.

Литература: Белик Э.В. Пчеловод. Словарь - справочник. - Ростов н/Д.: Феникс; Донецк: издательский центр "Кредо", 2007. <http://www.phoenixrostov.ru/> Феникс, <http://www.kredo.com.ua/> издательский центр "Кредо"

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, <http://www.medoviy.ru>