Кольпит (вагинит)

Воспаление слизистой оболочки влагалища, которое может быть вызвано какой-либо инфекцией, нарушением личной гигиены, неправильным питанием женщины или передаваться половым путем.

Грибковый (микотический) кольпит возникает от внедрения во влагалище различных грибков, чаще всего дрожжевого. Сиптомы заболевания — зуд и жжение во влагалище, гнойные выделения. Трихомонадный кольпит вызывается мочеполовым болезнетворным микробом трихомонадой и характеризуется обильными гнойными, пенистыми выделениями из влагалища, сопровождающимися жжением и зудом вульвы.
При наиболее распространенных гинекологических заболеваниях влагалища и шейки матки: белях, трихомонадном кольпите, эрозии, метрите, параметрите и аднексите — рекомендуется комбинированное лечение медом и трихополом. Мед и трихопол применяют внутрь в сочетании с местным лечением.
Медовые аппликации: после очистки секрета тампоном во влагалище вводят 20-30 г засахарившегося меда на стерильном марлевом тампоне, один конец которого остается снаружи, чтобы пациентка через 4—5 ч сама смогла его достать. Курс лечения — 10-20 аппликаций.

При первых процедурах могут быть зуд, жжение. Однако в дальнейшем неприятные ощущения исчезают, выделения уменьшаются. Лучшие виды меда: тимьяновый, липовый, с лесных цветов.

Вопрос о местном применении меда может решить только врач-гинеколог, поскольку его нельзя применять бесконтрольно: некоторые микробы мед используют как питательную среду.
При воспалении слизистой оболочки влагалища и шейки матки полезны сидячие ванны с 10%-ной прополисной водой или спиртовым экстрактом прополиса (20 мл на 5 л воды температурой 38-39°С, экспозиция 20-30 мин). Ванны делают через день. Курс лечения — 10-12 процедур.
В стеклянной посуде приготовить 3%-ный спиртовой раствор прополиса (спирт этиловый ректификат); полученным раствором обильно смачивать ватные тампоны и ежедневно (1 раз в сутки) закладывать их во влагалище.

Курсе лечения — 7-10 дней.
100 г медицинского вазелина (свиного очищенного жира) в эмалированной посуде довести до кипения и охладить до 50-60°С, добавить в него 10 г измельченного прополиса, при постоянном помешивании в течение 10 мин нагреть и выдержать смесь при температуре 70-80°С, в горячем виде профильтровать через марлю и при постоянном помешивании отфильтрованную массу охладить.

Ежедневно в течение 10-15 дней после очистки пораженного участка слизистой влагалища от секрета в него вводить ватный тампон, пропитанный приготовленной прополисной мазью, который вынимать в течение дня при крайней необходимости.
При лечении трихомонадного кольпита влагалище предварительно очищают.

- Глубоко вводят засахарившийся мед (в объеме 1 ч. ложки) и смазывают им шейку матки, стенки влагалища и его выход. Процедуры проводят ежедневно в течение 10—15 дней.

В начале лечения могут появиться зуд, жжение. Однако в последующем жалобы на субъективные неприятные ощущения исчезают, выделения уменьшаются.

При применении такого лечения у большинства женщин наступает полное выздоровление.

- Во влагалище вводится марлевый тампон, смоченный водным раствором меда, приготовленным в соотношении 1 часть меда и 2 части воды. Продолжительность удержания тампона 24 ч; всего необходимо провести 15-20 процедур.

Лечение женщины должно сопровождаться и лечением ее Мужа (полового партнера). В таких случаях мужчинам назначают Прием меда в суточной дозе 100-120 г (мед растворяют в воде комнатной температуры и выпивают в 3—4 приема в течение дня).

Курс лечения составляет 10-15 дней.

Дополнительно проводится промывание уретры и мочевого пузыря 20-30%-ным раствором меда через катетер.

Литература: Гребенников Е.А. Все о меде. - Мн.: Книжный дом, 2005. http://www.interpres.ru/ Интерпрессервис

© Гришин Михаил, 2014 г., mail@grishinmv.ru, http://www.medoviy.ru